



어린이가 건강한 대한민국



질병관리청

KMA

대한의사협회

예방접종전문위원회

표준예방접종일정표(2023)

대상 감염병	백신 종류 및 방법	횟수	출생시	4주이내	1개월	2개월	4개월	6개월	12개월	15개월	18개월	19~23개월	24~35개월	만4세	만6세	만11세	만12세
국가 예방접종	B형간염	HepB ^①	3	HepB 1차		HepB 2차			HepB 3차								
	결핵	BCG(피내용) ^②	1		BCG 1회												
	디프테리아·파상풍·백일해	DTaP ^③	5			DTaP 1차	DTaP 2차	DTaP 3차		DTaP 4차				DTaP 5차			
	Tdap/Td ^④	1															Tdap/Td 6차
	플리오	IPV ^⑤	4			IPV 1차	IPV 2차		IPV 3차							IPV 4차	
	b형헤모필루스인플루엔자	Hib ^⑥	4			Hib 1차	Hib 2차	Hib 3차	Hib 4차								
	폐렴구균	PCV ^⑦	4			PCV 1차	PCV 2차	PCV 3차	PCV 4차								
	PPSV ^⑧	-															고위험군에 한하여 접종
	로타바이러스	RV1 ^⑨	2			RV 1차	RV 2차										
	감염증	RV5 ^⑩	3			RV 1차	RV 2차	RV 3차									
	홍역·유형성아이신염·풍진	MMR ^⑪	2						MMR 1차						MMR 2차		
	수두	VAR ^⑫	1						VAR 1회								
	A형간염	HepA ^⑬	2							HepA 1~2차							
	일본뇌염	IJEV(불활성화 백신) ^⑭	5						IJEV 1~2차		IJEV 3차		IJEV 4차		IJEV 5차		
		IJEV(약독화 생백신) ^⑮	2						IJEV 1차		IJEV 2차						
	사람유두종바이러스감염증	HPV ^⑯	2														HPV 1~2차
	인플루엔자	IIV ^⑰	-														

• 국가예방접종: 국가에서 권장하는 필수예방접종(국가는 「감염병의 예방 및 관리에 관한 법률」을 통해 예방접종 대상 감염병과 예방접종 실시기간 및 방법을 정하고, 이를 근거로 재원을 마련하여 지원하고 있음)

① HepB(B형간염): B형간염 표면항원(HBsAg) 양성인 산모로부터 출생한 신생아는 출생 후 12시간 이내 B형간염 면역글로불린(HBIG)과 B형간염 백신(1차)을 동시에 접종하고, 2주와 3차 접종은 각각 출생 후 1개월 및 6개월에 실시

② BCG(결핵): 생후 4주 이내(34일까지) 접종, 생후 1개월에 2차 B형간염 백신과의 동시접종을 추천

③ DTaP(디프테리아·파상풍·백일해): DTaP-IPV(디프테리아·파상풍·백일해·플리오) 또는 DTaP-IPV/Hib(디프테리아·파상풍·백일해·플리오·b형헤모필루스인플루엔자) 혼합백신으로 접종 가능

④ Tdap(디프테리아·파상풍·백일해·파상풍 디프테리아): 만 11~12세 접종은 Tdap 또는 Td 백신으로 사용 가능하나, Tdap 백신을 우선 고려

※ 이후 10년마다 Td 재접종(만 11세 이후 접종 중 한 번은 Tdap으로 접종)

⑤ IPV(플리오): 3차 접종은 생후 6개월에 접종하나 18개월까지 접종 가능하며, DTaP-IPV(디프테리아·파상풍·백일해·플리오) 또는 DTaP-IPV/Hib(디프테리아·파상풍·백일해·플리오·b형헤모필루스인플루엔자) 혼합백신으로 접종 가능

⑥ Hib(b형헤모필루스인플루엔자): 생후 2개월 만 5세 미만 모든 소아를 대상으로 접종하며, 만 5세 이상은 b형헤모필루스인플루엔자 감염 위험성이 높은 경우(경상적질기증, 기능적 또는 해부학적 무비증, 항체치료에 따른 면역저하, 조절세포증, IPV, Hib 감염, 체액면역결핍, 초기요소나 보체결핍증 등) 접종, DTaP-IPV/Hib(디프테리아·파상풍·백일해·플리오·b형헤모필루스인플루엔자) 혼합백신으로 접종 가능

- DTaP-IPV(디프테리아·파상풍·백일해·플리오) 혼합백신: 생후 2, 4, 6개월에 DTaP-IPV 백신 대신 접종할 수 있음

- DTaP-IPV/Hib(디프테리아·파상풍·백일해·플리오·b형헤모필루스인플루엔자) 혼합백신: 생후 2, 4, 6개월에 DTaP-IPV/Hib 백신 대신 접종할 수 있음

* DTaP-IPV/Hib(디프테리아·파상풍·백일해·플리오·b형헤모필루스인플루엔자) 혼합백신: 만 4~6세에 DTaP-IPV/Hib 백신 대신 접종할 수 있음

* DTaP-IPV/Hib(디프테리아·파상풍·백일해·플리오·b형헤모필루스인플루엔자) 혼합백신: 만 4~6세에 DTaP-IPV/Hib 백신 대신 접종할 수 있음

⑦ PCV(폐렴구균백결핵): 10주와 13주 단백결합 백신 간에 교차접종은 권장하지 않음

⑧ PPSV(폐렴구균다상): 만 2세 이상의 폐렴구균 감염의 고위험군을 대상으로 하며 간강성태를 고려하여 담당의사와 충분한 상담 후 접종

※ 폐렴구균 감염의 고위험군:

- 면역기능이 저하자 소아: HIV 감염증, 만성신부전과 신증후군, 면역억제제나 방사선 치료를 하는 질환(악성종양, 백혈병, 림프종, 힐지킨병) 또는 고령 장기 이식, 선천 면역결핍질환

- 기능적 또는 해부학적 무비증 소아: 경상구 반월 또는 헤모글로빈증, 무비증 또는 비장 기능장애

- 면역 기능은 정상이나 다음과 같은 질환을 가진 소아: 간질·심장질환, 만성 폐질환, 만성 간 질환, 당뇨병, 뇌수막염, 낙농증, 인공외우 이식 상태